

CALENDÁRIO VACINAL SBlm 2026/2027

Do nascimento à terceira idade

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																		ADOLESCENTE		ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS												
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	SERVIÇOS PRIVADOS DE VACINAÇÃO	NOS CRIE*											
BCG ID	Uma dose	Vacinar os não vacinados anteriormente												Vacinar pessoas contactantes de hanseníase										SIM	SIM	NÃO										
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento										Vacinar os não vacinados anteriormente																		SIM	SIM	SIM					
Rotavírus		Vacina rotavírus monovalente: duas doses aos 2 e 4 meses de idade. Vacina rotavírus pentavalente: três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade.						Vacinar os não vacinados anteriormente D1 até 11 meses e 29 dias e última dose até 23 meses e 29 dias						CONTRAINDICADA																		SIM	SIM	NÃO		
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)		Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)										SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde			SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa						
Haemophilus influenzae b		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Vacinar pessoas em situações especiais de risco																		SIM, três primeiras doses			SIM	SIM	
Poliomielite (vírus inativados)		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										SIM, três primeiras doses e reforço aos 15 meses			SIM	SIM						
Pneumocócicas conjugadas		Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada VPC20, VPC15, VPC13 ou VPC10 (PNI), iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	VPC20, VPC15, VPC13 ou VPC10 (PNI) – Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC20, VPC15, VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco				VPC20, VPC15, VPC13: uma dose						SIM, VPC10, menores de 5 anos			SIM, VPC20 e VPC15	SIM, VPC10 e VPC13							
Pneumocócica 23 valente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco																		Uma dose	Duas doses com intervalo de cinco anos		NÃO			NÃO	SIM									
Meningocócica conjugada ACWY ou C		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	REFORÇO		Para não vacinados até 15 anos, duas doses com intervalo de cinco anos. A partir de 16 anos, uma dose		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										SIM, menC aos 3 e 5 meses, menACWY no reforço aos 12 meses e para 11-14 anos			SIM	SIM, menC e menACWY					
Meningocócica B		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – Duas doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada																		Vacinar pessoas em situações especiais de risco			NÃO	SIM	NÃO
Influenza (gripe)		VACINAÇÃO ANUAL																		SIM, Trivalente menores de 6 anos e maiores de 60 anos			SIM, Tri ou Tetravalente e HD3V (60 anos ou +)		SIM, Trivalente											
Febre amarela		Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. / Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. / Recomendação da SBlm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBlm recomenda uma segunda dose dez anos após. / Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.																		SIM			SIM		NÃO											
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)		Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, até 59 anos			SIM	NÃO								
Varicela (catapora)		Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM			SIM	SIM								
Hepatite A		Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos			SIM	SIM								
HPV**		Duas doses com intervalo mínimo de seis meses entre elas.										Vacinar adultos com três doses (0-1 a 2-6 meses)		Duas doses, dois meses de intervalo. A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco										Duas doses, dois meses de intervalo. Rotina a partir dos 50 anos		SIM, HPV4 uma dose para meninas e meninos de 9 a 14 anos.			SIM, HPV9	SIM, HPV4 três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais						
Herpes zóster		Duas doses, dois meses de intervalo. A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco																		Duas doses, dois meses de intervalo. Rotina a partir dos 50 anos		NÃO			SIM		NÃO									
Dengue***		Qdenga® é recomendada entre 4 e 60 anos, independente de contato prévio com o vírus da dengue – duas doses com intervalo de três meses entre elas.																		SIM, Qdenga® para 10 a 14 anos			SIM		NÃO											
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19																																			
VSR	Nirsevimabe – Dose única para < 8 meses na primeira sazonalidade										Imunizar crianças em situações especiais de risco		Vacina VSR**** – Uma dose										A partir de 70 anos: Rotina		SIM, Nirsevimabe para prematuros e crianças de risco. Vacina Abrysvo® para gestantes			SIM	NÃO							


22/04/2026 – Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBlm 2026/2027* e nos *Calendários de vacinação SBlm pacientes especiais*.

* Consultar manual do CRIE em <https://sbim.org.br/images/calendarios/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-edicao-2023.pdf> (acesso em 23.05.2025). Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBlm pacientes especiais*.

** Esquemas para menores de 20 anos. PNI: HPV4 uma dose dos 9-14 anos. SBlm: HPV9 duas doses dos 9-19 anos e três doses de 20 anos em diante.

*** Notas técnicas do MS: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue/notas-tecnicas>

**** Arexvy® (GSK) e Abrysvo® (Pfizer) rotina para idosos > 70 anos. Recomendadas para pessoas, em condições de risco, dos 18 aos 69 anos de idade. Ver *Calendário de vacinação SBlm pacientes especiais*. Uma dose, aplicar a qualquer momento, independente da sazonalidade. Não há dados disponíveis que comprovem a necessidade de doses adicionais. Somente a vacina Abrysvo® (Pfizer) está licenciada para gestantes. Deve ser aplicada em gestantes de qualquer idade, a partir de 28 semanas de gestação, a cada gestação. Uso entre 24 e 27 semanas de IG a critério médico.



Manual do CRIE



Calendários de vacinação SBlm